

Hướng dẫn phái nữ lựa chọn kháng sinh tránh thai sử dụng các biện pháp an toàn và hợp lý

Lựa chọn thuốc ngừa thai thích hợp có nguy cơ là một thách thức đối với chị em. Đa phần phái nữ đều chưa hiểu hết về thuốc ngừa thai và cần thiết sử dụng dạng nào sử dụng các biện pháp an toàn, thích hợp.

Sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu các ưu và điểm hạn chế của những kiểu kháng sinh tránh thai khác nhau để có các quyết định phù hợp giúp bản thân.



Đặc điểm không giống nhau của các dạng kháng sinh ngừa thai

Có hai kiểu thuốc kháng sinh tránh thai chính:

Thuốc ngừa thai kết hợp

Kiểu thuốc này có chứa cả estrogen và progestin. Có khá nhiều loại thuốc kháng sinh kết hợp để bạn chọn lựa, dựa vào mức độ luôn bạn muốn đèn đỏ nguyệt và liều lượng hormone phù hợp nhất với bạn.

Những mini pill

Kiểu thuốc này chỉ đựng progestin. Những minipill không đem đến nhiều sự chọn lựa ví dụ thuốc phối hợp. Trong mỗi gói kháng sinh, toàn bộ những viên thuốc đều chứa cọng 1 lượng progestin và toàn bộ những viên thuốc đều vận động. Liều progestin trong một minipill không cao hơn liều progestin trong bất cứ viên thuốc phối hợp nào.

Kháng sinh tránh thai kết hợp có nhiều lần loại kháng sinh hoạt đặc điểm và không hoạt động, căn cứ vào tần suất bạn muốn có kinh:

Thông thường

Gói thông hay thường chứa 21 viên thuốc vận động và bảy viên thuốc không hoạt động, hoặc 24 viên thuốc kháng sinh vận động và bốn viên kháng sinh không vận động.

Liều liên tục hoặc chu kỳ kéo dài

Những gói này hay đựng 84 viên thuốc vận động và bảy viên kháng sinh không hoạt động. Những ngày kinh nguyệt chỉ bắt gặp bốn lần một năm, trong thời gian bạn lấy thuốc không hoạt động.

Thuốc ngừa thai phối hợp cũng được phân loại theo liệu liều lượng hormone trong thuốc kháng sinh vận động duy trì nguyên hoặc thay thế đổi:

- Liều đơn: trong dạng thuốc kháng sinh ngừa thai phối hợp này, mỗi viên kháng sinh hoạt tính có chứa cọng một lượng estrogen và progestin.
- Đa liều: trong kiểu kháng sinh ngừa thai kết hợp này, lượng hormone trong thuốc kháng sinh hoạt động khác nhau.

Hầu hết những kiểu kháng sinh ngừa thai phối hợp có cất 10 đến 35 microgam ethinyl estradiol, đây là 1 loại estrogen. Đàn bà miễn cảm với hormone có thể nên sử dụng loại 1 viên cất 1 liều estrogen.

Cơ chế hoạt động của những dạng kháng sinh tránh thai

Thuốc kháng sinh tránh thai phối hợp phòng tránh buồng trứng của bạn phát hành trứng. Chúng cũng làm trễ tiến trình của trứng qua ống dẫn trứng, thực hành dày chất nhầy cổ tử cung và làm theo mỏng niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung). Hầu như các việc này giúp duy trì cho tinh

binh không tham gia trứng.

[Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội](#)

[Cách phá thai nhanh nhất](#)

[Phá thai hết bao nhiêu tiền](#)

[Địa chỉ phá thai an toàn Hà Nội](#)

[Bệnh viện phá thai](#)

[Uống thuốc phá thai có ảnh hưởng gì không](#)

[Phá thai giá bao nhiêu](#)

[Phá thai ở đâu an toàn](#)

[Chi phí phá thai an toàn](#)

[Thời điểm phá thai an toàn](#)

[Cách nạo phá thai](#)

[Mua thuốc phá thai](#)

[Phong kham phá thai](#)

[Bảng giá phá thai an toàn](#)

[Chi phí phá thai](#)

[Địa chỉ phá thai về trong ngày](#)

[Phá thai ở đâu Bắc Ninh](#)

Những minipill làm theo trễ tiến trình của trứng qua ống dẫn trứng, thực hành dày chất nhầy cổ tử cung và làm theo sạch nội mạc tử cung - Hầu hết đều cho ngăn tinh binh tới trứng. Các minipill thỉnh thoảng cũng ngăn ngừa sự rụng trứng.

Có buộc phải hầu hết những dạng thuốc tránh thai thích hợp giúp tất cả mọi người?

Bác sĩ sẽ hỏi về tiền sử bệnh và bất cứ dạng kháng sinh nào đang sử dụng để xác định kiểu thuốc ngừa thai nào hợp lý. Chuyên gia có thể không

khuyến cáo dùng thuốc tránh thai kết hợp nếu bạn:

- Vừa mới sinh con
- Nghiêm trọng hơn 35 tuổi và hút thuốc
- Làm chủ cao huyết áp
- Mặc phải thay đổi đông huyết hay có tiền sử huyết khối mạch máu sâu hoặc tắc mạch phổi
- Có tiền sử ung thư vú
- Có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh tim
- Có các biến chứng mối liên quan tới bệnh tiểu đường
- Mặc bệnh gan hoặc túi mật
- Có tiền sử đau đốn nửa đầu
- Có chảy máu tử cung không rõ nguyên nhân

Chuyên gia của bạn có nguy cơ không khuyến khích dùng minipill nếu bạn:

- Gặp phải ung thư vú
- Có một số bệnh về gan
- Có ra máu tử cung không rõ nguồn gốc
- Dùng kháng sinh chống co giật hoặc thuốc kháng sinh ngăn chặn lao.

Những ưu và khuyết điểm của thuốc kết hợp

Điểm cộng

- Dễ thực hiện đảo ngược phương pháp ngừa thai trường hợp bạn hy vọng mang bầu.
- Suy yếu hội chứng tiền kinh nguyệt (pms).
- Chuột rút kinh nguyệt ít nặng (đau bụng kinh).
- Gia tăng mụn nhọt trứng cá.
- Ít lâu hơn, nhẹ hơn và dễ dự báo hơn, hoặc ít hơn hoặc không có lúc.
- Giảm chảy máu nghiêm trọng (rong kinh) và mất máu mối quan hệ.
- Giảm biểu hiện lạc nội mạc tử cung.
- Suy nhược khả năng ung thư buồng trứng, nội mạc tử cung và đại trực tràng.
- Có khả năng tác động tích cực tới mật độ xương gia tăng sự tiến triển tóc không cần đến (hirsutism) gây nên vì hội chứng buồng trứng đa nang.

Điểm hạn chế

- Bỏ kháng sinh hay lấy muộn có khả năng làm suy nhược lợi ích tốt.
- Không bảo vệ phòng tránh các bệnh truyền nhiễm qua giao hợp, bao gồm cả hiv.
- Tăng nguy cơ cholesterol cao, đau đởn tim và đột quy.
- Nâng cao khả năng đông máu, nhất là đối với người bệnh hút thuốc và phụ nữ trên 35 tuổi, có khả năng đông huyết cao hơn một chút so với thuốc đưng liều estrogen cao hơn.
- Nâng cao khả năng ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho những nữ giới hiện đang dùng thuốc tránh thai phối hợp, song khả năng này dường thí dụ giảm dần đến mức bình luân thời gian bạn giới hạn uống thuốc kháng sinh.
- Những tác động phụ như chảy máu bất thường, đầy khá, đau đởn vú, mót nôn, trầm cảm, nâng cao cân và đau đởn đầu.

Các ưu và điểm hạn chế của minipill

Ưu thế

- Dễ thực hiện đảo ngược phương pháp tránh thai nếu bạn hy vọng mang thai.
- Có thể đưng làm nhanh chóng cả khi bạn có một vài thắc mắc sức khỏe làm tăng nguy cơ sử dụng thuốc kháng sinh phối hợp, như là viêm máu đông, đau đởn nửa đầu, huyết áp cao hay nguy cơ mắc phải tim cao.
- Ít có khả năng hơn thuốc phối hợp để can thiệp vào việc giúp con bú.

Khuyết điểm

- Nên lấy cộng 1 lúc mỗi ngày - Ví như bạn bỏ qua 1 viên thuốc kháng sinh hoặc lấy thuốc muộn hơn 3 giờ, bạn cần phải sử dụng 1 hình thức kiểm chế sinh sản dự phòng trong ít nhất hai ngày.
- Không bảo vệ ngăn ngừa các căn bệnh truyền nhiễm qua giao hợp, bao gồm cả hiv.
- Các công dụng phụ như là ra máu kinh nguyệt bị rối loạn, hòn nang buồng trứng, suy yếu kích thích, đau đởn đầu, đau vú, nổi mụn, tăng cân, trầm cảm và hirsutism.
- Tăng nhẹ khả năng rằng ví như mang thai, trứng đưng có bầu sẽ cấy bên cùng với tử cung (thai cùng với tử cung).

Có thể kể, ngừa thai với thuốc kháng sinh là cách ngừa thai hiệu quả. Tuy nhiên, bạn gái cần thiết nắm rõ ưu và nhược điểm cũng như đối tượng nào

cần phải dùng loại nào để sử dụng các biện pháp an toàn, lợi ích tốt nhất.